

O volume prescrito superou a capacidade da cápsula. Tome ____ cápsulas, ao invés de ____ para atingir a dosagem prescrita pelo médico.

Cód. A.001 | 38x10mm

SUBSTÂNCIA COM BAIXO ÍNDICE TERAPÊUTICO

Cód. A.005 | 38x10mm

"ATENÇÃO: ESTA SUBSTÂNCIA SOMENTE DEVE SER UTILIZADA QUANDO DILUÍDA."

Cód. A.009 | 38x10mm

ANTIULCEROSO

Cód. A.013 | 38x10mm

NÃO CONTÉM LACTOSE

Cód. A.017 | 38x10mm

EM USO

Cód. B.001 | 38x10mm

USO EXCLUSIVO PARA DIABÉTICO

Cód. B.005 | 38x10mm

MANTER NA GELADEIRA

Cód. B.009 | 38x10mm

NÃO INGERIR O MEDICAMENTO EM JEJUM.

Cód. B.013 | 38x10mm

CUIDADO! PODE MANCHAR TECIDOS

Cód. B.017 | 38x10mm

USO ADULTO E PEDIÁTRICO VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Cód. B.021 | 38x10mm

ANTES DE TOMAR O MEDICAMENTO LEIA O RÓTULO COM ATENÇÃO

Cód. B.025 | 38x10mm

NÃO INGERIR BEBIDA ALCOÓLICA DURANTE O TRATAMENTO

Cód. B.029 | 38x10mm

EVITE LUZ, CALOR, UMIDADE, CHEIROS FORTES E RADIAÇÕES

Cód. B.033 | 38x10mm

MANHÃ

Cód. A.002 | 38x10mm

AO PERSISTIREM OS SINTOMAS O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO

Cód. A.006 | 38x10mm



Cód. A.010 | Ø23mm

ESTRADIOL

Cód. A.014 | 38x10mm

Celulomax SL; Aerosil®, Amido pré-gelatinizado e Microcel®.

Cód. A.018 | 38x10mm

USO INTERNO

Cód. B.002 | 38x10mm

TOMAR 01 VEZ POR SEMANA

Cód. B.006 | 38x10mm

__CÁPSULA(S)=__DOSE

Cód. B.010 | 38x10mm

TODO MEDICAMENTO DEVE SER MANTIDO FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

Cód. B.014 | 38x10mm

INGERIR __CÁPS / GOTAS A CADA __HORAS.

Cód. B.018 | 38x10mm

Por razão técnica foram feitas ____ cáps., ao invés de ____ cáps. Portanto tomar ____ cáps., ao invés de ____ cáps.

Cód. B.022 | 38x10mm

MANTER BEM FECHADO, AO ABRIGO DA LUZ, CALOR E UMIDADE

Cód. B.026 | 38x10mm

Por motivos técnicos, o medicamento foi dividido em partes A e B. Ingerir 01 cápsula de cada parte

Cód. B.030 | 38x10mm

MANTER O PRODUTO A TEMPERATURA NEGATIVA

Cód. B.034 | 38x10mm

CAFÉ DA MANHÃ

Cód. B.038 | 38x10mm

DOSE ÚNICA

Cód. A.003 | 38x10mm

DEIXAR AGIR DE 5 A 10 MINUTOS ANTES DE ENXAGUAR

Cód. A.007 | 38x10mm

MATÉRIA-PRIMA A VENCER

Cód. A.011 | 38x10mm

ESTRIOL

Cód. A.015 | 38x10mm

PRODUTO TÓXICO

Cód. B.003 | 38x10mm

CUIDADO CONTÉM ÁCIDO

Cód. B.007 | 38x10mm

CONTÉM 5% DE ETANOL

Cód. B.011 | 38x10mm

CONTÉM CÁPSULAS GASTRO-RESISTENTES

Cód. B.015 | 38x10mm

"DEPOIS DE ABRIR O MEDICAMENTO CONSERVAR EM GELADEIRA"

Cód. B.019 | 38x10mm

ADULTOS E CRIANÇAS ACIMA DE 12 ANOS VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Cód. B.023 | 38x10mm

Pode ocorrer variação de COR e/ou ODOR, por se tratar de um produto de origem natural.

Cód. B.027 | 38x10mm

CONSERVAR O PRODUTO A TEMPERATURA < 8C.

Cód. B.031 | 38x10mm

Este produto contém álcool em sua composição.

Cód. B.035 | 38x10mm

USAR A ESPÁTULA

Cód. B.039 | 38x10mm

MEDICAMENTO APROVADO PELO CONTROLE DE QUALIDADE

Cód. A.004 | 38x10mm

USO VAGINAL

Cód. A.008 | 38x10mm

CITOSTÁTICO

Cód. A.012 | 38x10mm

CREME PARA AS MÃOS

Cód. A.016 | 38x10mm

PROVADOR

Cód. B.004 | 38x10mm

PROTEGER DA UMIDADE

Cód. B.008 | 38x10mm

Contém 0,5% de ETANOL

Cód. B.012 | 38x10mm

NÃO RETIRE O ALGODÃO

Cód. B.016 | 38x10mm

ESTE MEDICAMENTO DEVE SER UTILIZADO PELO PERÍODO MÍNIMO INDICADO PELO MÉDICO MESMO QUE OS SINTOMAS TENHAM DESAPARECIDO.

Cód. B.020 | 38x10mm

ANTES DO USO CONFIRA O MEDICAMENTO COM A RECEITA

Cód. B.024 | 38x10mm

"ATENÇÃO: Este Medicamento pode causar HIPERTENSÃO PULMONAR."

Cód. B.028 | 38x10mm

Medicamento formulado de acordo com a quantidade descrita na receita. Por motivo técnico foi utilizado embalagem com maior capacidade.

Cód. B.032 | 38x10mm

FEB	VAL
JAN	JAN
FEV	FEV
MAR	MAR
ABR	ABR
MAI	MAI
JUN	JUN
JUL	JUL
AGO	AGO
SET	SET
OUT	OUT
NOV	NOV
DEZ	DEZ

Cód. B.036 | 38x10mm

AVISO LEIA COM ATENÇÃO O MODO DE TOMAR!

Cód. B.040 | 38x10mm

"NOITE"

Cód. B.041 | 38x10mm

**GARANTIA DE QUALIDADE
EMBALAGEM LACRADA**

Cód. B.045 | 38x10mm

ATENÇÃO!
A COLORAÇÃO MANCHADA DAS CÁPSULAS,
É DEVIDO AO REVESTIMENTO PARA
LIBERAÇÃO ENTERICA.

Cód. B.049 | 38x10mm

**EVITAR CONTATO COM
OLHOS E MUCOSAS**

Cód. B.053 | 38x10mm

**CUIDADO!
CONTÉM ÁCIDO**

Cód. B.057 | 38x10mm

**USO
VETERINÁRIO**

Cód. B.061 | 38x10mm

**NÃO APLICAR
NA ÁREA DOS OLHOS**

Cód. B.069 | 38x10mm

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETIÇÃO DA RECEITA**

Cód. B.073 | 38x10mm

**PROTEGER DO CALOR, DO SOL E
RADIÇÕES ELETROMAGNÉTICAS**

Cód. B.077 | 38x10mm

Guardar ao abrigo da luz,
calor e umidade
Manter fora do alcance de crianças

Cód. B.081 | 38x10mm

**CONSERVAR ESTE
PRODUTO EM GELADEIRA**

Cód. B.085 | 38x10mm

3 PUMP = 1ml

Cód. B.089 | 38x10mm

**ESTE PRODUTO PODE CAUSAR
VERMELHIDÃO NA PELE.**

Cód. B.093 | 38x10mm

**INGERIR __ CÁPS
APÓS O ALMOÇO**

Cód. B.097 | 38x10mm

**INGERIR EM NOITES
ALTERNADAS**

Cód. B.101 | 38x10mm

**MANTER A TEMPERATURA
ABAIXO DE 25°C**

Cód. B.042 | 38x10mm

**EVITE CONTATO
COM OS OLHOS**

Cód. B.046 | 38x10mm

**FARMACOPÉIA
BRASILEIRA**

Cód. B.050 | 38x10mm

CONTÉM AÇÚCAR

Cód. B.054 | 38x10mm

CUIDADO AO USAR

Cód. B.058 | 38x10mm

USO EXTERNO

Cód. B.062 | 38x10mm

"SUBSTÂNCIA PURA"

Cód. B.066 | 38x10mm

**PROTEGER
DO CALOR E DO SOL**

Cód. B.070 | 38x10mm

**USO ADULTO E
PEDIÁTRICO(CRIANÇAS + 3 ANOS)
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETIÇÃO DA RECEITA**

Cód. B.074 | 38x10mm

REFEIÇÃO

Cód. B.078 | 38x10mm

**ANTES DE USAR O MEDICAMENTO
LEIA O RÓTULO COM ATENÇÃO**

Cód. B.082 | 38x10mm

**Evitar exposição ao sol
durante o tratamento.**

Cód. B.086 | 38x10mm

2X 2X 2X 2X 2X 2X 2X
Atenção: Por motivos técnicos foram
feitas cápsulas **dobro** contendo 1/2
da dose em cada cápsula. Portanto tome
2 cápsulas ao invés de 1.

Cód. B.090 | 38x10mm

**INGERIR __ CÁPS
__ VEZES AO DIA**

Cód. B.094 | 38x10mm

**INGERIR __ CÁPS
APÓS O JANTAR**

Cód. B.098 | 38x10mm

**INGERIR EM DIAS
ALTERNADOS**

Cód. B.102 | 38x10mm

USO PEDIÁTRICO

Cód. B.043 | 38x10mm

JANTAR

Cód. B.047 | 38x10mm

TOMAR EM JEJUM

Cód. B.051 | 38x10mm

**MEDICAMENTO
FITOTERÁPICO**

Cód. B.055 | 38x10mm

VENCIDO

Cód. B.059 | 38x10mm

FRÁGIL

Cód. B.063 | 38x10mm

AGITE ANTES DE USAR

Cód. B.067 | 38x10mm

**USO ADULTO E PEDIÁTRICO
VENDA SOB RETENÇÃO
DA RECEITA**

Cód. B.071 | 38x10mm

**USO ADULTO
VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
SÓ PODE SER VENDIDO COM
RETIÇÃO DA RECEITA**

Cód. B.075 | 38x10mm

**SEM ADIÇÃO
DE AÇÚCAR**

Cód. B.079 | 38x10mm

MANTER EM LOCAL FRESCO

Cód. B.083 | 38x10mm

**ATENÇÃO DIABÉTICOS
CONTÉM GLICOSE**

Cód. B.087 | 38x10mm

3X 3X 3X 3X 3X 3X 3X
Atenção: Por motivos técnicos foram
feitas cápsulas **em triplo** contendo 1/3
da dose em cada cápsula. Portanto tome
3 cápsulas ao invés de 1.

Cód. B.091 | 38x10mm

**INGERIR __ CÁPS
DE __ EM __ HORAS**

Cód. B.095 | 38x10mm

**INGERIR __ CÁPS
ANTES DAS REFEIÇÕES**

Cód. B.099 | 38x10mm

USO HOSPITALAR

Cód. B.103 | 38x10mm

**A COR DA CÁPSULA
NÃO ALTERA SUA EFICÁCIA**

Cód. B.044 | 38x10mm

"SUBSTÂNCIA DILUÍDA"

Cód. B.048 | 38x10mm

**DIETILPROPIONA É SINÔNIMO
DE ANFEPRAMONA**

Cód. B.052 | 38x10mm

**USO EM
CONSULTÓRIO**

Cód. B.056 | 38x10mm

URGENTE

Cód. B.060 | 38x10mm

AMOSTRA GRÁTIS

Cód. B.064 | 38x10mm

**PROTEGER DO
CALOR E UMIDADE**

Cód. B.068 | 38x10mm

***MANTER FORA DO
ALCANCE DE CRIANÇAS***

Cód. B.072 | 38x10mm

**"PRODUTO CONTRA INDICADO
PARA CRIANÇAS
MENORES DE 2ANOS"**

Cód. B.076 | 38x10mm

**EMBALAGEM
BIODEGRADÁVEL**

Cód. B.080 | 38x10mm

**Venda sob prescrição médica
sem retenção da receita.**

Cód. B.084 | 38x10mm

**ESTE PRODUTO PODE CAUSAR
IRRITAÇÃO NA PELE.**

Cód. B.092 | 38x10mm

**INGERIR __ CÁPS
__ VEZES P/ SEMANA**

Cód. B.096 | 38x10mm

**__ CÁPS. __ VEZ POR SEMANA
30 MIN. ANTES DO CAFÉ DA MANHÃ
COM 1 COPO CHEIO DE ÁGUA.
FICAR EM PÉ!**

Cód. B.100 | 38x10mm

CONDROITINA _____ MG
GLUCOSAMINA _____ MG

Cód. B.104 | 38x10mm

Por motivos técnicos dividimos o conteúdo de uma cápsula em duas iguais, portanto tome duas cápsulas ao invés de uma.

Cód. B.105 | 35x22mm

APLICAR SOMENTE A NOITE, USAR FILTRO SOLAR DURANTE O DIA E EVITE EXPOSIÇÃO AO SOL.

Cód. B.109 | 38x10mm

VENDA SOB PRESCRIÇÃO ODONTOLÓGICA

Cód. B.113 | 38x10mm

FENILCETONÚRICOS: CONTÉM FENILALANINA

Cód. B.117 | 38x10mm

Dióxido de silício coloidal, Estearato de magnésio, Silicato de magnésio, Celulose microcristalina

Cód. B.121 | 38x10mm

APROVADO

Cód. G.001 | 38x10mm

CUIDADO!!! CONTÉM 01 CÁPSULA DE DESIDRATANTE. NÃO INGERIR

Cód. G.005 | 38x10mm

MANTER EM LOCAL FRESCO

Cód. G.009 | 38x10mm

CREME PARA OS PÉS

Cód. G.014 | 38x10mm

SENSIBILIZANTES

Cód. L.001 | 38x10mm

Antes do Treino

Cód. L.005 | 38x10mm

PRODUTO DA PORTARIA 344

Cód. P.001 | 38x10mm

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA" ESTE PRODUTO PODE CAUSAR HIPERTENSÃO PULMONAR

Cód. P.005 | 38x10mm

USO ANAL

Cód. P.009 | 38x10mm

Diluído 1 : 10

Cód. R.001 | 38x10mm

"Venda Sob Prescrição Médica" ATENÇÃO: O Uso Incorreto Causa Resistência do Virus da AIDS e Falha no Tratamento.

Cód. V.001 | 38x10mm

CAUSA SONOLÊNCIA Não dirija ou manuseie máquinas.

Cód. V.005 | 38x10mm



Utilizar este produto somente à noite, durante o dia usar filtro solar

Cód. B.106 | Ø23mm

Perigo de Ingestão

Cód. B.110 | 38x10mm

ATENÇÃO
Este como qualquer outro medicamento de uso tópico tem a possibilidade de ocorrência de reações adversas, principalmente para peles potencialmente propensas. Faça o teste no antebraço antes de usar.

Cód. B.114 | 38x10mm

Não necessita de refrigeração, manter em local fresco e ao abrigo da luz.

Cód. B.118 | 38x10mm

Dióxido de silício coloidal, Carbômero, Estearato de magnésio, Hidroxipropilmetilcelulose, Celulose microcristalina

Cód. B.122 | 38x10mm

CONTÉM 01 CÁPSULA DE DESIDRATANTE

Cód. G.002 | 38x10mm

CUIDADO PRODUTO CAUSTICO

Cód. G.006 | 38x10mm

FÓRMULA MODIFICADA

Cód. G.010 | 38x10mm

NÃO CONTÉM GLÚTEN

Cód. G.015 | 38x10mm

ANTIBIÓTICO

Cód. L.002 | 38x10mm

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA" O abuso deste medicamento pode causar dependência.

Cód. P.002 | 38x10mm

"Venda Sob Prescrição do Médico Veterinário, com Retenção Obrigatória da Notificação de Receita."

Cód. P.006 | 38x10mm

HORMÔNIO

Cód. P.010 | 38x10mm

Diluído 1 : 100

Cód. R.002 | 38x10mm

"Venda Sob Prescrição Médica" ATENÇÃO: Não use este Medicamento sem consultar o seu Médico, caso esteja Grávida, Ele pode causar Problemas ao Feto"

Cód. V.002 | 38x10mm

"VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA" Só pode ser vendido com retenção da receita.

Cód. V.006 | 38x10mm

CUIDADO CONTÉM ÁCIDO
O uso incorreto deste pode causar queimaduras à pele e danos aos olhos.

Cód. B.111 | 38x10mm

CAPACIDADE = ____ ML

Cód. B.115 | 38x10mm

Celulomax HG:
Aerosil®, Estearato de magnésio, silicato de magnésio e Microcel.

Cód. B.119 | 38x10mm

HIGROSCÓPICO

Cód. B.123 | 38x10mm

CONTÉM SÍLICA DESSECANTE "NÃO INGERIR"

Cód. G.003 | 38x10mm

Produto Natural

Cód. G.007 | 38x10mm

Depois do Treino

Cód. G.011 | 38x10mm

Celulomax LM:
Aerosil®, Carbopol®, Estearato de magnésio, Methocel® e Microcel®

Cód. G.016 | 38x10mm

ESTRONA

Cód. L.003 | 38x10mm

"Venda Sob Prescrição Médica" ATENÇÃO: Pode Causar Dependência Física ou Psíquica"

Cód. P.003 | 38x10mm

PRODUTO CONTROLADO PELA POLÍCIA FEDERAL

Cód. P.007 | 38x10mm

SACHÊ DISSOLVER EM ÁGUA OU CONFORME ORIENTAÇÃO MÉDICA. MISTURAR BEM E TOMAR LOGO A SEGUIR.

Cód. P.011 | 38x10mm

"Venda Sob Prescrição Médica" ATENÇÃO: Risco para Mulheres Grávidas. Causa Graves Defeitos da Face, nas Orelhas, no Coração e no Sistema Nervoso do Feto"

Cód. V.003 | 38x10mm

URGENTE

Cód. V.007 | 38x10mm

NÃO USAR NA GESTAÇÃO E LACTAÇÃO.

Cód. B.108 | 38x10mm

EM CERTIFICAÇÃO

Cód. B.112 | 38x10mm

CAPACIDADE = ____ g

Cód. B.116 | 38x10mm

Dióxido de silício coloidal, Amido pré gelatinizado, Celulose microcristalina

Cód. B.120 | 38x10mm

CONFIRA O RÓTULO COM A RECEITA

Cód. G.004 | 38x10mm

HORMÔNIO

Cód. G.008 | 38x10mm

PREGNENOLONA

Cód. G.012/ 013 | 38x10mm

FOTOSENSÍVEL

Cód. L.004 | 38x10mm

"ATENÇÃO: Este Medicamento pode causar HIPERTENSÃO PULMONAR"

Cód. P.004 | 38x10mm

USO VAGINAL

Cód. P.008 | 38x10mm

USAR PROTETOR SOLAR

Cód. V.004 | 38x10mm

"DIA"

Cód. V.008 | 38x10mm

SEM SAL

Cód. V.009 | 38x10mm

TARDE

Cód. V.013 | 38x10mm

A VENCER 2 MESES

Cód. V.017 | 38x10mm

MANHÃ

Cód. V.020 | 38x10mm

ATENÇÃO
Usar somente 1,0g (um grama)
por aplicação

Cód. V.024 | 38x10mm

1 DOSE = 1 CÁPSULA

Cód. Y.001 | 38x10mm

Dissolver o conteúdo de 1 sachê em 1/2 copo
de água (120 ml). Não gelada. Esperar total
efervescência e tomar conforme orientação médica.

Cód. Y.005 | 38x10mm

A VENCER 3 MESES

Cód. Y.009 | 38x10mm

1 DOSE = 5 CÁPSULAS

Cód. Y.013 | 38x10mm

DOSE = CÁPSULAS

Cód. Y.017 | 38x10mm

Antibiótico

Cód. Y.021 | 38x10mm

POSOLOGIA:

Ingerir ___ cáps./gotas a cada ___ hs.
Passar ___ vez(es) ao dia.
Tomar ___ colher(es) ___ vez(es) ao dia.
Tomar/Ingerir APÓS as refeições.
Tomar/Ingerir ANTES das refeições.

Cód. QD.001 | 35x22mm

• Siga corretamente o modo de usar.
• Não desaparecendo os sintomas ou
ocorrendo reações adversas,
informe ao seu médico.
• Mantenha esse produto fora do
alcance das crianças.
• Proteja da luz, calor e umidade.

Cód. QD.005 | 50x23mm

- CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
- VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA
- DEIXAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
- EVITAR O USO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS
- USO INTERNO

Cód. QD.009 | 35x22mm

ATENÇÃO

Cód. V.010 | 38x10mm

VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA

Cód. V.014 | 38x10mm

CARDIOLÓGICO

Cód. V.018 | 38x10mm

"Sublingual"

Cód. V.025 | 38x10mm

1 DOSE = 2 CÁPSULAS

Cód. Y.002 | 38x10mm

"Venda Sob Prescrição Médica"
"ATENÇÃO: Não use este
Medicamento sem consultar o seu
Médico, caso esteja Grávida. Ele pode
causar Problemas ao Feto".

Cód. Y.006 | 38x10mm

Cápsula Incolor

Cód. Y.010 | 38x10mm

1 DOSE = 6 CÁPSULAS

Cód. Y.014 | 38x10mm

PROGESTERONA

Cód. Y.018 | 38x10mm

• Siga corretamente o modo de usar.
• Não desaparecendo os sintomas ou
ocorrendo reações adversas,
informe ao seu médico.
• Mantenha esse produto fora do
alcance das crianças.
• Proteja da luz, calor e umidade.

Cód. QD.002 | 35x22mm

SUBSTÂNCIA DILUÍDA

NOME DA SUBSTÂNCIA

FATOR DE DILUIÇÃO

Cód. QD.006 | 50x23mm

- USO INTERNO
- USO EXTERNO
- CONSERVAR EM LOCAL FRESCO
- CONSERVAR EM GELADEIRA
- DEIXAR FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS
- AGITE ANTES DE USAR

Cód. QD.010 | 35x22mm

UTILIZAR EM 30 DIAS

Cód. V.011 | 38x10mm

HORMÔNIO

Cód. V.015 | 38x10mm

Substância RDC nº 354/2003

Cód. V.019 | 38x10mm

Durante do Treino

Cód. V.022 | 38x10mm

1 DOSE = 3 CÁPSULAS

Cód. Y.003 | 38x10mm

QUARENTENA

Cód. Y.007 | 38x10mm



Cód. Y.011 | Ø23mm

DILUIR ___ MEDIDA(S) EM ___ ML DE ÁGUA

Cód. Y.015 | 38x10mm

Celulomax E: Ac. Esteárico,
Croscarmellose sódica, Lauril sulfato
de sódio, Aerosil® e Microcel®.

Cód. Y.019 | 38x10mm

ATENÇÃO SUBSTÂNCIA DILUÍDA

Cód. QD.003 | 35x22mm

REPROVADO

Cód. V.012 | 38x10mm

Dentro e fora do prazo de validade
de substâncias não é possível
manter em uma só cápsula
a concentração indicada na receita.
Tomar Cápsulas
que correspondem
a dose indicada
por seu médico

Cód. V.016 | Ø23mm

TESTOSTERONA

Cód. V.023 | 38x10mm

1 DOSE = 4 CÁPSULAS

Cód. Y.004 | 38x10mm

LEIA ATENTAMENTE O RÓTULO ANTES DE ABRIR O MEDICAMENTO

Cód. Y.008 | 38x10mm

Por razão técnica foram feitas ___ cáps.,
ao invés de ___ cáps. Portanto tomar
___ cáps., ao invés de ___ cáps.

Cód. Y.012 | 38x10mm

DILUIR ___ ENVELOPE(S) EM ___ ML DE ÁGUA

Cód. Y.016 | 38x10mm

1 DOSE = CÁPSULA(S)

Cód. Y.020 | 38x10mm

ATENÇÃO ESTA SUBSTÂNCIA É PURA, DEVE SER UTILIZADA QUANDO DILUÍDA

Cód. QD.004 | 50x23mm

POSOLOGIA

- INGERIR ___ CÁPS/GOTAS A CADA ___ HS.
- PASSAR ___ VEZ(ES) AO DIA.
- TOMAR ___ COLHER(ES) ___ VEZ(ES) AO DIA.
- TOMAR/INGERIR APÓS AS REFEIÇÕES.
- TOMAR/INGERIR ANTES AS REFEIÇÕES.

Cód. QD.007 | 50x23mm

Uso Externo

- Atenção, antes de usar conferir o rótulo e a receita
- Manter longe do alcance de crianças
- Proteger da luz, calor e umidade
- Em caso de gravidez procurar o seu médico
- Conservar em geladeira
- Agitar antes de usar
- Cuidado: Produto cáustico
- Uso proibido em crianças

Cód. QD.011 | 33x23mm

Uso Interno

- Atenção, antes de usar conferir o rótulo e a receita
- Manter longe do alcance de crianças
- Proteger da luz, calor e umidade
- Em caso de gravidez procurar o seu médico
- Conservar em geladeira
- Agitar antes de usar

Cód. QD.012 | 33x23mm